

# SUBUTEX

## “subáč” (buprenorfin)

- Patří do skupiny opiátů, opioidní analgetikum.
- Subutex, resp. buprenorfin, je návyková psychotropní látka s podobnými účinky jako heroin, morfin nebo jiná látka ze skupiny opioidů. Jedná se tedy nejen o lék, ale i návykovou látku či drogu, jejíž pravidelné užívání ústí v závislost. Je však nezbytné říci, že užívání Subutexu je mnohem méně rizikové, než užívání heroinu.
- Subutex se užívá při substituční léčbě. Substituce znamená nahrazení a obecně patří mezi principy Harm Reduction, tedy snižování rizika braní. O substituční léčbě se však mluví v souvislosti se subutexem u lidí závislých na opiátech, především pak heroinu.
- Jedná se tedy o nahrazení ilegálně získávané, často kontaminované drogy (heroin), užívané injekčně, látkou s podobnými vlastnostmi, která je čistá.

### **ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ**

#### **Sublingválně**

- V podobě tablety, nechá se rozpustit pod jazykem. Lék se tak vyhne krevnímu oběhu i játrům a nedochází tak k jeho metabolizaci.
- Subutex není určen k aplikaci do žíly, protože lék může obsahovat nerozpustné součásti, které mohou způsobit ucpaní žíly. U užívání nitrožilně je pravděpodobnost: - zánětu žil, embolií, úmrtí

### **ÚČINKY A RIZIKA**

- Subutex (buprenorfin) má účinky stejné, nebo podobné jako jiné látky ze skupiny opioidů:
- Způsobuje útlum centrálního nervového systému, silně potlačuje bolest.
- Dojde k celkovému zklidnění, ve vyšších dávkách se dostaví ospalost.
- Vyvolává euforii, kterou většina uživatelů vnímá jako slabší v porovnání s heroinem.
- Tlumí dechové centrum. U citlivých jedinců, ve vysokých dávkách nebo v kombinaci s jinými tlumivými látkami, může dojít i k zástavě dýchání.

- Dochází k oslabení kašlacího reflexu a podráždění centra pro zvracení. Jedinci, kteří opiáty neužívají a nejsou na jejich efekt zvyklí po první dávce často vrhnou.
- Na první pohled patrným účinkem je zúžení zornice.
- Z ostatních účinků je důležitý především vliv na sexuální život a na pohlavní orgány. Opioidy celkově snižují zájem o sexuální aktivity. U žen užívání Subutexu obvykle nevede k potlačení ovulace, jako je tomu často při pravidelném užívání heroinu. Mnoho uživatelky je pak řekvapeno těhotenstvím. Je proto dobré současně s nasazením Subutexu zvažovat i vhodnou antikoncepci. Muži, kteří užívají Subutex mívají někdy obtíže s erekcí. Ty obvykle zmizí po vysazení Subutexu. Přetrvávají v různé míře i ostatní, pro opioidy typické účinky:
- Svědění kůže s typickým poškrabováním se. Někdy obtíže s močením - retence (zadržení) moči pro poruchu funkce močového měchýře. Zácpa. Pocení. Někdy slabost a ztráta energie.

## **HISTORIE**

Buprenorfin byl objeven v roce 1960, v roce 1978 se začal používat jako lék proti bolesti a později k detoxifikační a substituční léčbě při závislosti na opioidech. Je to polosyntetický derivát jednoho z alkaloidů opia - thebainu. Subutex se v průběhu let 2002 a 2003 stal jednou z nejpobulárnějších drog opiátového typu na našem trhu. Dá se říci, že ve většině drogových scén vytlačil heroin a to i přes to, že účinek Subutexu je možné charakterizovat jako méně "zábavný" ve srovnání s heroinem.



### **KONTAKTNÍ CENTRUM LITOMĚŘICE**

Centrum prevence závislosti  
Lidická 57/11, 412 01 Litoměřice  
Otevírací doba PO-PÁ 7:00 – 16:00

Tel: 416 737 182, 728 262 683 e-mail: info@kclitomerice.cz  
www.kclitomerice.cz, facebook: Kontaktní centrum Litoměřice  
zákon 108/2006 Sb., §59 – Kontaktní centra



### **TERÉNNÍ PROGRAM LITOMĚŘICKA**

Prevence závislosti

Osvození 191/17, 412 01 Litoměřice  
Provozní doba PO-PÁ 7:30 – 16:00

Tel: 606 229 979, email: terenni.program@kclitomerice.cz  
www.kclitomerice.cz, Facebook: Kontaktní centrum Litoměřice  
zákon 108/2006 Sb., §69 – Terénní programy



**Primární prevence Litoměřice**

Centrum prevence

Lidická 57/11, 412 01 Litoměřice

Tel: +420 416 737 182, +420 602 276 022 e-mail: primarni.prevence@kclitomerice.cz

www.kclitomerice.cz facebook: Primární prevence Litoměřice